В Республике Алтай на 24.04.2012. зарегистрировано 230 человек (116 детей), обратившихся к медикам по поводу укуса клеща. Это в 1,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда было 144 покусанных (в том числе 58 детей).

5 человек заболели клещевым сыпным тифом.

Вирусологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводятся исследования клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита. В 2012 году уже исследовано 66 клещей (12 - положительных к вирусу КЭ, то есть зараженность клещей составила 18%). В 2011 году в эти же сроки было исследовано 25 клещей (2 положительных).

В республике начаты противоклещевые обработки мест массового посещения. Обработаны городские скверы и парки, кладбища. Общая площадь акарицидных обработок составила 6,6 га.

Самая высокая численность клещей отмечается в апреле и мае! В этом году по прогнозу численность клещей будет выше, чем в 2011 году (что уже подтверждается выше приведенными числами).

Так как заражение людей происходит при присасывании клеща, следует соблюдать меры предосторожности.

## Напоминаем:

Приобретайте противоклещевые аэрозоли, которыми в этот период надо пользоваться

постоянно. Хорошо зарекомендовали себя «Гардекс», «Москитол», «Off». Они продаются в аптеках. Выбирайте аэрозоли с пометкой «от клещей». Эти средства должны быть в машине, дома, на даче. Работайте в саду (в огороде, в лесу, в поле) только в обработанной одежде. Кроме того, нужно осматриваться как можно чаще (каждые 15-20 минут), чтобы удалить еще ползающих клещей.

Возьмите за правило - каждый день перед сном осматривать детей и себя. Чем раньше обнаружен и удален клещ – тем благоприятнее прогноз.

Непривитым надо застраховаться на случай укуса клеща! Стоимость страхового полиса – 300 рублей. Помните, что иммуноглобулин против клещевого энцефалита лучше всего вводить в первые сутки после обнаружения клеща.

Есть необычные случаи заражения клещевыми инфекциями. Были случаи заражения клещевым энцефалитом, клещевым сыпным тифом при раздавливании клещей, снятых с коров или собак. Этого делать нельзя (возбудители болезни проникают в кровь через микроранки на руках). Дважды люди заражались, удаляя напившихся клещей с кошек — при раздавливании клеща жидкость из него брызнула в глаз человека и вызвала клещевой энцефалит.

Кроме того, в клещевой сезон опасно молоко коров и коз (которых кусают клещи). В Республике Алтай было больше десятка случаев заражения клещевым энцефалитом таким путем, поэтому любое молоко нужно кипятить!

Если клещ все же присосался ...